

## 柠檬酸合酶(citrate synthase, CS)试剂盒

分光光度法 25 管/12 样

**注    意：**正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

CS (EC 2.3.3.1) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体基质中，是三羧酸循环第一个限速酶，是三羧酸循环主要调控位点之一。

### 测定原理：

CS 催化乙酰 CoA 和草酰乙酸产生柠檬酰辅酶 A，进一步水解产生柠檬酸。该反应促使无色的 DTNB 转变成黄色的 TNB，在 412nm 处有特征吸光值。

### 需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰、无水乙醇和蒸馏水

### 试剂组成和配制：

试剂一：液体 25mL×1 瓶，-20℃保存；

试剂二：液体 5mL×1 瓶，-20℃保存；

试剂三：液体 0.5mL×1 支，-20℃保存；

试剂四：液体 28mL×1 瓶，4℃保存；

试剂五：粉剂×1 瓶，4℃保存；

试剂六：粉剂×1 支，-20℃保存，临用前加入 1.2mL 蒸馏水，用不完的试剂仍-20℃保存；

### 样本的前处理：

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离：

- ①称取约 0.1g 组织或收集 500 万细胞，加入 1mL 试剂一和 10uL 试剂三，用冰浴匀浆器或研钵匀浆。
- ②将匀浆 600g, 4℃离心 5min。
- ③弃沉淀，将上清液移至另一离心管中，11000g, 4℃离心 10min。
- ④上清液即胞浆提取物，可用于测定从线粒体泄漏的 CS（此步可选做）。
- ⑤在步骤④的沉淀中加入 200uL 试剂二和 2uL 试剂三，超声波破碎（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3 秒，间隔 10 秒，重复 30 次），用于线粒体 CS 测定。

#### 测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 412nm，蒸馏水调零。

#### 2、样本测定

(1) 在试剂五中加入 0.6mL 无水乙醇和 13mL 试剂四，混匀，37℃（哺乳动物）或 25℃（其

它物种）孵育 5min；用不完的试剂分装后-20℃保存，禁止反复冻融；

(2) 测定管：在 EP 管中加入 40 μL 样本、880 μL 试剂五和 40 μL 试剂六，混匀，37℃反应 15min 后立即测定吸光值 A1。

(3) 对照管：在 EP 管中加入 40 μL 样本、880 μL 试剂四和 40 μL 试剂六，混匀，37℃反应 15min 后立即测定吸光值 A2。

(4) 计算  $\Delta A = A1 - A2$ ，每个测定管设一个对照管。

#### CS 活性计算：

(1) 按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 nmol TNB 定义为一个酶活力单位。CS (nmol/min /mg prot)  
 $= [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 117.6 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$

此法需要自行测定样本蛋白质浓度。

(2) 按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1 nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$CS \text{ (nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 23.8 \times \Delta A \div W$$

(3)

**按细菌或细胞密度计算：**

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1 nmol TNB 定义为一个酶活力单位。  
 $CS \text{ (nmol/min/10^4 cell)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 109] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 0.0475 \times \Delta A \times V_{\text{反总}}$ : 反应体系总体积,  $9.6 \times 10^{-4} \text{ L}$ ;  $\epsilon$ : TNB 摩尔消光系数,  $1.36 \times 10^4 \text{ L/mol/cm}$ ;  $d$ : 比色皿光径,  $1\text{cm}$ ;  $V_{\text{样}}$ : 加入样本体积,  $0.04 \text{ mL}$ ;  $V_{\text{总}}$ : 加入提取液体积,  $0.202 \text{ mL}$ ;  $T$ : 反应时间,  $2 \text{ min}$ ;  $C_{pr}$ : 样本蛋白质浓度,  $\text{mg/mL}$ ;  $W$ : 样本质量,  $\text{g}$ ;  $500$ : 细胞或细菌总数,  $500 \text{ 万}$ 。